

今回は、行列のジョルダンの標準形について PID 上の加群の理論の立場から概説しよう。つぎのような基本仮定を出発点とする。

基本仮定

$k$  は体であるとし、ある正の整数  $n$  について行列  $L \in M_n(k)$  が与えられているとする。このとき、一変数多項式環  $k[X]$  の  $V = k^n$  への作用が

$$p(X).v = p(L)v$$

で定まるのであった。(例 3.3) これにより、 $V$  を  $k[X]$ -加群と見よう。

$k[X]$  は PID であるから、一般論 (命題 9.7) により、次の命題が成り立つことがわかる。

**命題 11.1.** 基本仮定のもとで、 $V$  は  $k[X]/(p(X)^e)$  ( $p(X)$  は  $k[X]$  の素元。  $e$  は正の整数) の形の  $k[X]$ -加群の直和である。

**命題 11.2.**  $f(X) \in k[X]$  を

$$f(X) = c_d X^d + c_{d-1} X^{d-1} + c_{d-2} X^{d-2} + \cdots + c_1 X + c_0$$

と書こう。  $g(X) \in k[X]$  の  $k[X]/(f(X))$  におけるクラスを  $[g]_f$  と書くことにする。このとき、

(1)  $k[X]/(f(X))$  の基底として、

$$\{b_l = [X^l]_f; \quad (l = 0, 1, 2, \dots, d-1)\}$$

が取れる。

(2) 上の基底を用いると  $X$  の作用は

$$X.b_l = \begin{cases} b_{l+1} & (0 \leq l < d-1 \text{ のとき}) \\ -(c_{d-1}b_{d-1} + c_{d-2}b_{d-2} + \cdots + c_1b_1 + c_0b_0) & (l = d-1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

と書き下せる。

**例 11.3.**  $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$  の基底として  $b_0 = [1]_{X^2+1}$ ,  $b_1 = [X]_{X^2+1}$  が取れる。  $X$  のこの基底への作用は、

$$\begin{aligned} X.b_0 &= b_1 \\ X.b_1 &= -b_0 \end{aligned}$$

で与えられる。行列で表現すれば、

$$(X.b_0 \quad X.b_1) = (b_0 \quad b_1) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

という具合である。

**定義 11.4.** 体  $k$  が代数的閉体であるとは、 $k$  上の任意の (次数が 1 以上の) 一変数多項式  $p(X)$  が一次式の積に分解するときを言う。

複素数体  $\mathbb{C}$  は代数的閉体であることが知られている。任意の体  $k$  に対して、それを含むような最小の代数的閉体  $\bar{k}$  が存在することが知られている。このような  $\bar{k}$  のことを  $k$  の代数的閉包と呼ぶ。

以下、 $k$  が代数的閉体のときを主に考える。このときには  $k$  上の一変数既約多項式は一次式に限るから、次のことがわかる。

**命題 11.5.** 基本仮定のもとで、さらに  $k$  が代数的閉体であるとき、 $V$  は  $k[X]/((X-c)^e)$  ( $c \in k$ ,  $e \in \mathbb{Z}_{>0}$ ) の形の  $k[X]$ -加群と同型である。

命題 11.2 のような基底を取れば、 $k[X]/(X-c)^e$  上の  $X$  の作用の表現を得ることができるが、 $c$  だけずらすことによって、さらに良い基底を取ることできる。

**命題 11.6.** (1)  $k[X]/((X-c)^e)$  の基底として、

$$\{b_l = [(X-c)^l]_f; \quad (l = 0, 1, 2, \dots, e-1)\}$$

が取れる。

(2) 上の基底を用いると  $X$  の作用は

$$X.b_l = \begin{cases} cb_l + b_{l+1} & (0 \leq l < e-1 \text{ のとき}) \\ cb_l & (l = e-1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

と書き下せる。行列で書くと

$$(X.b_0 \ X.b_1 \ X.b_2 \ \dots \ X.b_{e-1}) = (b_0 \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{e-1}) \begin{pmatrix} c & & & & \\ 1 & c & & & \\ & 1 & c & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & c \end{pmatrix}.$$

もしくは、基底の順番を取り換えて、

$$(X.b_{e-1} \ X.b_{e-2} \ X.b_{e-3} \ \dots \ X.b_0) = (b_{e-1} \ b_{e-2} \ b_{e-3} \ \dots \ b_0) J_e(c)$$

ただし  $J_e(c)$  はジョルダン細胞と呼ばれる次のような行列である。

$$J_e(c) = \begin{pmatrix} c & 1 & & & \\ & c & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & c & 1 \\ & & & & c \end{pmatrix}.$$

系 11.7. 代数的閉体  $k$  上の行列  $L \in M_n(k)$  が与えられたとき、うまい基底変換行列  $P \in GL_n(k)$  をとれば、

$$PLP^{-1} = \begin{pmatrix} J_{e_1}(c_1) & & & & \\ & J_{e_2}(c_2) & & & \\ & & J_{e_2}(c_2) & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & J_{e_s}(c_s) \end{pmatrix}$$

とジョルダン細胞の「直和」に分解される。

問題 11.1.  $n = 2$  で、

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

のとき、基本仮定のようにして  $V = \mathbb{C}^2$  を  $\mathbb{C}[X]$  加群と見よう。このとき、 $V$  は  $k[X]$  上  $e_1 = {}^t(1 \ 1)$  で生成されることを示しなさい。

問題 11.2. 前問の仮定のもとで、 $\mathbb{C}[X]$ -加群の同型  $\mathbb{C}[X]/(X-2)(X-3) \cong V$  を作ってみせなさい。